

PROVA CONEIXEMENTS DE FISIOTERÀPIA D'ATENCIÓ SOCIOANITARI DE LA CONVOCATÒRIA
OBERTA D'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DE L'IAS
Referència 2022_1010_2

1. Quina tipus d'articulació permet un major nombre de moviments:
 - a. Diartrosis.
 - b. Enartrosis.**
 - c. Amfiartrosis.
 - d. Sinartrosis.
2. Respecte a la mobilització passiva articular manual, és FALS que:
 - a. La mobilització passiva consta de dos temps o seqüències d'execució.**
 - b. Ha de respectar els eixos i plans fisiològics.
 - c. No ha de provocar dolor.
 - d. La influència de la velocitat de la mobilització és inversament proporcional a la viscositat del líquid sinovial.
3. Quins de les següents intervencions NO està aconsellada pel tractament de l'osteoporosi:
 - a. Magnetoteràpia.
 - b. Educació postural.
 - c. Massatge amb percussions.**
 - d. Exercici actiu.
4. Quin test permet observar la gibositat d' una escoliosis:
 - a. Prova Neer.
 - b. Test de Jobe.
 - c. Test de Klein.
 - d. Test d'Adams.**
5. Respecte al pacient ancià amb una fractura proximal d'húmer, és FALS que:
 - a. Ha de realitzar exercici de les articulacions lliures d'extremitat superior afecta.
 - b. La mobilització precoç de l'espatlla pot provocar-li rigidesa articular.**
 - c. La mobilització precoç de l'espatlla disminueix el dolor.
 - d. Les maniobres brusques i forçades en la primera fase de tractament estan contraindicades.
6. En el treball dinàmic concèntric:
 - a. El moment motor és igual al moment resistent.
 - b. El moment motor és major al moment resistent.**
 - c. El moment motor és menor al moment resistent.
 - d. El moment motor és menor que la velocitat del moviment.
7. Respecte al treball en cadena cinètica oberta, és CERT que:
 - a. L'extrem distal del segment és fixe.
 - b. La majoria d'activitats de la vida diària s'executen amb aquest tipus de cadena.**
 - c. Estan indicades quan el pacient pot començar a fer càrrega.
 - d. Anar en bicicleta és la típica cadena cinètica oberta.

8. Quin mètode realitza un treball estàtic intermitent per l'enfortiment muscular:
 - a. Delorme y Watkins.
 - b. Mac Govern y Luscombe.
 - c. Rocher.
 - d. Troisier.**
9. Respecte a les palanques, si la resistència està entre el fulcre i la potència la palanca és de:
 - a. Primer gènere.
 - b. Segon gènere.**
 - c. Tercer gènere.
 - d. Quart gènere.
10. Quin reflex no es relaciona amb els estiraments:
 - a. Reflex miotàtic.
 - b. Inervació recíproca.
 - c. Reflex d'estirament invers.
 - d. Reflex de Gordon.**
11. És CERT que:
 - a. La propiocepció informa de la sensació de moviment i posició del cos.**
 - b. La propiocepció es troba augmentada davant de processos isquèmics.
 - c. Els quimiorceptors no són receptors sensorials.
 - d. La propiocepció no pot treballar-se de forma precoç.
12. Respecte els patrons de FNP de Kabat, és FALS que:
 - a. Són moviments integrats globals que es realitzant en diagonal i espiral.
 - b. Un múscul o grup muscular dèbil pot estimular-se pel desbordament energètic generat per la contracció d'un múscul o grup muscular potent.
 - c. És important realitzar el patrons amb reforç visual.
 - d. No s'utilitza reforç verbal.**
13. És FALS que, la facilitació neuromuscular propioceptiva:
 - a. Es basa en un enfoc positiu del tractament.
 - b. Permet aconseguir el nivell funcional més alt del pacient.
 - c. És un mètode basat en la globalitat del individu.
 - d. Totes les respostes anteriors són falses.**
14. És CERT que:
 - a. El massatge augmenta la viscositat sanguínia.
 - b. Massatge transvers profund està contraindicat sobre calcificacions tendinoses.**
 - c. El drenatge limfàtic manual provoca eritema.
 - d. El massatge disminueix la permeabilitat de la pell.
15. És CERT que:
 - a. El massatge pot aplicar-se a partir del primer mes d'embaràs.
 - b. Els punts gallet es formen per un excés de gaba en la placa motora.
 - c. El massatge està indicat en edemes d'origen renal, cardíac o hepàtic.
 - d. La maniobra de buidatge actua principalment sobre el sistema venós superficial.**

16. Quina de les següents maniobres de massatge provoca la màxima vascularització del múscul:
- a. **Amassament profund.**
 - b. Amassament superficial.
 - c. Pressions.
 - d. Fregaments.
17. Una maniobra de massatge més mobilització articular i estirament rep el nom de:
- a. Tècnica de raspall.
 - b. Esponja.
 - c. **Massatge funcional.**
 - d. Neuromuscular.
18. Les sigles IAS volen dir:
- a. Institució d'Assistència Sanitària.
 - b. **Institut d'Assistència Sanitària.**
 - c. Institut d'Assistència Sociosanitària.
 - d. Institució d'Assistència Sociosanitària.
19. L'amputació de Syme, és una:
- a. Amputació mig tarsiana.
 - b. Desarticulació escapulohumeral.
 - c. Amputació 1/3 mig de fèmur.
 - d. **Amb desarticulació del turmell.**
20. En la contractura isquèmica de Volkman en la fase de seqüeles NO presenta:
- a. Trastorns tròfics cutanis.
 - b. Retracció muscular i tendinosa.
 - c. **Rigidesa articular reductible.**
 - d. Trastorns sensitius.
21. Respecte al síndrome de dolor regional complex, és FALS que:
- a. Cursa amb trastorns vasomotors.
 - b. Pot desencadenar-se per diferents causes.
 - c. Evoluciona en diferents fases.
 - d. **Totes les respostes anteriors són falses.**
22. L'escala de Constant ens permet avaluar els resultats clínics d'una:
- a. **Reparació del manegot dels rotadors.**
 - b. Lligamentoplàtia del quadrat anterior.
 - c. Artroplàstia de maluc.
 - d. Amputació transfemoral.
23. Quina de les següents tipus d'electroteràpia presenta un efecte atèrmic:
- a. Diatèrmia resistiva.
 - b. Ona curta emissió contínua.
 - c. Microones d'emissió contínua.
 - d. **Ultrasò pulsàtil.**

24. Respecte a l'espalla congelada, és FALS que:
- a. La rigidesa primària sol aparèixer entre els 40 i 60 anys.
 - b. Afecta més a homes.**
 - c. Evoluciona en tres fases.
 - d. En la fase 2 la intensitat de dolor disminueix.
25. En un pacient amb artritis reumatoïdea NO s'aplicarà:
- a. Massatge profund transvers.**
 - b. Exercici actiu.
 - c. Parafina.
 - d. Hidroteràpia.
26. Respecte al síndrome d'impingement, és FALS que:
- a. La mobilitat passiva pot estar conservada.
 - b. Apareix estenosis del manegot dels rotadors en l'espai subacromial.
 - c. En l'estadi II de Neer apareix fibrosis.
 - d. Es potenciaran els músculs amb efecte cranial del cap de l'húmer.**
27. Segon Paul Dotte, és FALS que una persona gran dependent:
- a. Pot presentar una autonomia nul·la en tècniques de desplaçaments
 - b. Pot presentar una autonomia insuficient en tècniques de desplaçaments
 - c. En les tècniques de desplaçament no han de rebre ajuda dels cuidadors**
 - d. Ha de desplaçar-se de manera que el procediment sigui l' oportú, passant de mode passiu al controlat.
28. Respecte el Mètode Perfetti, és FALS que:
- a. És sinònim d' exercici terapèutic cognoscitiu.
 - b. S'utilitza únicament per la recuperació de la mà i peu del pacient hemiplègic.**
 - c. Utilitza processos cognitius de percepció, atenció, memòria i llenguatge per a l'activació del moviment.
 - d. La tècnica va néixer pel tractament de la mà del pacient hemiplègic.
29. Quin signe indica la presència d'espasticitat:
- a. Signe de Spurling
 - b. Signe de la navalla.**
 - c. Signe de Tinel.
 - d. Signe de Phalen.
30. La fisioteràpia en el pacient amb Alzheimer NO contempla o aconsella:
- a. Mantenir el major temps possible una qualitat de vida independent.
 - b. Potenciar l'aparell locomotor.
 - c. L'educació de la família o cuidadors sobre aspectes sanitaris com la prevenció de lesions.
 - d. L'ús de l'electroteràpia per a les alteracions sensitives que pot presentar el pacient.**

31. Quina de les següents tècniques es caracteritza per treballar en quadrupèdia:
- Schroth.
 - McKenzie.
 - Klapp.**
 - Hipopressius.
32. En la recuperació d'un esquinç de turmell:
- El treball de la propiocepció és essencial.**
 - S'aconsella no treballar la propiocepció.
 - La propiocepció s'incorpora en fases tardanes.
 - La mobilitat articular del turmell indica el moment d'incorporar la propiocepció al tractament.
33. Davant una rizartrosis podem utilitzar parafina. Quin és el punt de fusió de la parafina:
- 35º - 38ºC.
 - 39º - 42ºC.
 - 42º - 45ºC.
 - 45º - 50ºC.**
34. Si la prova de Lasègue és positiva indica afectació:
- Radicular.**
 - Articular.
 - Muscular.
 - Capsular.
35. Sobre quin múscul haurem d'actuar si apareix el signe de Bonnet:
- Piramidal.**
 - Tibial anterior.
 - Radial.
 - Pectoral major.
36. Quina de les següents patologies es caracteritza per presentar sensibilització central:
- Fibromiàlgia.**
 - Osteoartritis.
 - Ruptura de lligament quadrat anterior.
 - Fractura de fèmur.
37. Respecte l'espondiloartritis anquilosant, és FALS que:
- La patologia també s'anomena malaltia de Bechterew.
 - L'inici de la malaltia és ràpid.**
 - Una de les tècniques a utilitzar com a tractament és la termoteràpia.
 - El quadre clínic es pot acompanyar d'uveïtis.
38. El procés d'envelliment és:
- Una malaltia.
 - Una lesió.
 - Un procés patològic.
 - Un procés fisiològic.**

39. La força de la musculatura respiratòria es valora a través de:
- Gasometria.
 - Pressió inspiratòria i espiratòria màxima.**
 - Volum residual.
 - Cap de les anteriors.
40. Respecte a la malaltia pulmonar obstructiva crònica, és FALS que:
- Cursa amb tos.
 - S'acompanya de secrecions pulmonars.
 - S'auscullen sibilàncies.
 - Les parets de les vies aèries es tornen més elàstiques.**
41. Respecte a l'ELTGOLD (Espiració Lenta Total amb Glotis Oberta en Decúbit Lateral), és CERT que:
- El pacient es col·locarà en decúbit lateral sobre el pulmó contra lateral.
 - Està contraindicada en pacients amb COVID-19.
 - La tècnica s'acompanya d'una pressió manual en abdomen.**
 - No presenta contraindicacions.
42. És CERT que, l'espirometria:
- Avalua la funció respiratòria.**
 - Permet mesura la saturació d'oxigen en sang.
 - Es basa en la inspiració i espiració amb el temps i ritme que el pacient vulgui.
 - No valora la relació VEF1/CV.
43. Quins dominis valora l'escala Fugl-Meyer:
- Funció motora, equilibri, sensibilitat, rang de moviment i dolor articular.**
 - Funció motora, equilibri, sensibilitat, rang de moviment.
 - Funció motora, equilibri, rang de moviment i dolor articular.
 - Funció motora, sensibilitat, rang de moviment i dolor articular.
44. Respecte a l'apràxia, és FALS que:
- És un trastorn neurològic caracteritzat per la pèrdua de la capacitat de dur a terme moviments o gestos.
 - En l'apràxia hi ha comprensió de les ordres.
 - El principal lòbul afectat és el parietal.
 - S'anomena "dispràxia" quan l'apràxia presenta una severitat greu.**
45. Respecte a les mobilitzacions neurodinàmiques, és CERT que:
- L'objectiu principal és actuar sobre el sistema nerviós perifèric.**
 - Actua especialment en sistema nerviós central.
 - Són tècniques invasives al actuar directament sobre el sistema nerviós.
 - Les mobilitzacions neurodinàmiques amb tensió no provoquen un efecte analgèsic immediat.
46. Quin mètode terapèutic utilitzaries en la recuperació d'una hemiplegia:
- Bobath i/o Perfetti.**
 - McKenzie.
 - Kegel.
 - Stanish.

47. És CERT que:
- a. El dolor referit és sinònim de dolor irradiat.
 - b. El dolor radicular en una ciàlgia es cataloga com a dolor referit.
 - c. Els punts gallet miofascials no desencadenen dolor referit.
 - d. **Les disfuncions viscerals poden provocar dolor referit.**
48. És CERT que, l'aplicació de crioteràpia sobre l'espasticitat:
- a. Provoca una disminució de l'espasticitat mantinguda a llarg termini.
 - b. Està contraindicada.
 - c. **Provoca una disminució transitòria de l'espasticitat.**
 - d. La crioteràpia pel tractament de l'espasticitat només pot aplicar-se amb criomassatge.
49. Les transferències de sedestació a bipedestació en els pacients amb hemiplègia s'ha de:
- a. **Bloquejar el genoll plègic amb el nostre genoll.**
 - b. Bloquejar la cintura pelviana.
 - c. Bloquejar ambdós genoll.
 - d. Totes les respostes anteriors són falses.
50. Respecte a l'artroplàstia total de maluc, és CERT que:
- a. **La marxa i recuperació ha d'iniciar-se precoçment.**
 - b. La recuperació precoç augmenta el risc de tromboembolisme.
 - c. Amb un abordatge quirúrgic posterior s'ha de posar atenció en els moviments de extensió, adducció i rotació externa de maluc.
 - d. Totes les respostes anteriors són certes.
51. L'ancià fràgil es caracteritza per presentar:
- a. **Una situació inestable que el predisposa a un deteriorament important.**
 - b. Una patologia aguda.
 - c. Una patologia crònica.
 - d. Cap de les respostes anteriors és certa.
52. Quina escala avalua la qualitat de vida relacionada amb la salut:
- a. VSI.
 - b. Lawton.
 - c. **SF-36.**
 - d. Yesavage.
53. Quin instrument està indicat per a l'avaluació del dolor d'un pacient amb dificultats per comunicar-se:
- a. Escala visual analògica.
 - b. **Escala Campbell.**
 - c. Escala McGrill.
 - d. Escala de Borg.

54. Respecte a la prevenció de caigudes, és FALS que:
- a. En la prevenció primària s'identifiquen els factors de risc de caigudes.
 - b. La prevenció secundària incideix sobre els factors de risc de caigudes després de caigudes prèvies.
 - c. La prevenció terciària es centra en disminuir la presència d'incapacitat després d'una caiguda.
 - d. **La prevenció de caigudes només es tracta en fisioteràpia domiciliària.**
55. A l'aplicar corrents galvàniques haurem de vigilar de NO provocar:
- a. **Cremades.**
 - b. Sudoració.
 - c. Hiperèmia.
 - d. Eritema.
56. Quins exercicis podries utilitzar per millorar la incontinència en l'ancià:
- a. Mc Kenzie.
 - b. Hiperpressius.
 - c. **Kegel.**
 - d. Pold.
57. Respecte el TENS, és CERT que:
- a. **El BURST provoca vibració muscular.**
 - b. Actua sobre el dolor localitzat però no irradiat.
 - c. Millora el dolor referit però no irradiat.
 - d. Està indicat pel dolor agut però no crònic.
58. Respecte a la magnetoteràpia, és CERT que el pol:
- a. NORT atreu càrregues positives.
 - b. SUR atreu càrregues negatives.
 - c. **NORT provoca recalcificació òssia.**
 - d. Els dos pols tenen els mateixos efectes.
59. La reobase és:
- a. **Una intensitat.**
 - b. Una resistència.
 - c. Un temps.
 - d. Un potencial d'acció.
60. En la marxa de quatre punts el pacient:
- a. **Ha de poder recolzar el pes en ambdues extremitats inferiors.**
 - b. S'utilitza quan el pacient no pot recolzar l'extremitat inferior afectada.
 - c. Desplaça les croses entre 5 i 10 cm.
 - d. No s'utilitza quan el pacient presenta inestabilitat en el seu equilibri.
61. No s'aplicarà tractament amb làser de baixa intensitat en:
- a. Lesiones en parts toves.
 - b. Cremades.
 - c. Cicatrius.
 - d. **Zona ocular.**

62. Respecte l'osteoartritis, és CERT que:
- a. Segons la classificació de Kellgren i Lawrence una artrosis en un grau II apareix desalineació articular.
 - b. El dolor millora amb el moviment després d'inactivitat.**
 - c. Per evitar el dolor és necessari el repòs.
 - d. La rigidesa articular apareix progressivament durant el dia amb el moviment.
63. La termoteràpia superficial està indicada en patologies degeneratives de l'aparell locomotor. L'escalfament dels teixits serà:
- a. Lleu o moderat.**
 - b. Profund.
 - c. Molt profund.
 - d. Depèn de la via de propagació de la calor.
64. L'ús d'aigües medicinals s'anomena:
- a. Balneoteràpia.**
 - b. Talassoteràpia.
 - c. Crenoteràpia.
 - d. Peloides.
65. La hidroteràpia està indicada en:
- a. Neoplàsies actives.
 - b. Hidrofòbia.
 - c. Incontinència fecal.
 - d. Patologies osteoarticular degeneratives.**
66. Després de la retirada d'un guix per fractura bimal·leolar estan indicats els banys de contrast, és CERT que:
- a. La temperatura de l'aigua a de ser d'aproximadament de 38-44°C i 10-20°C.**
 - b. La temps d'aplicació és 4 minuts d'aigua freda i 1 minut d'aigua calenta.
 - c. L'objectiu dels banys de contrast és aconseguir una vasodilatació mantinguda en el temps.
 - d. No presenten contraindicacions.
67. L'allitament NO tendeix a provocar:
- a. Úlceres per pressió.
 - b. Trastorns circulatoris.
 - c. Complicacions respiratòries.
 - d. Retraccions en flexió dorsal del peu.**
68. Respecte a la Llei de Dependència, quin dels següents graus és correcte:
- a. Grau I. Correspon a una dependència lleu.
 - b. Grau II. Dependència moderada.
 - c. Grau III. Dependència gran dependència.**
 - d. Grau IV. Dependència severa amb necessitat d'hospitalització.

69. Quin mètode permet la correcta mobilització de malalts amb postures segures pel fisioterapeuta:
- a. **Dotte.**
 - b. Mulligan.
 - c. Frenkel.
 - d. Ai Chi.
70. Quina tècnica d'embenat funcional es denomina tècnica tova:
- a. Tècnica mixta.
 - b. Tècnica d'immobilització.
 - c. **Tècnica de contenció.**
 - d. Tècnica combinada.
71. Respecte al cross-tape, és FALS que:
- a. Té forma de malla.
 - b. És un embenat neuromuscular.
 - c. Està indicat per desactivar punts gallet miofascial.
 - d. **És cataloga com a un tipus d'embenat neuromuscular elàstic.**
72. Respecte a la marxa normal, és CERT que:
- a. La longitud de la gambada és igual que la longitud del pas.
 - b. La longitud de la gambada és menor que la longitud del pas.
 - c. **La longitud de la gambada és major que la longitud del pas.**
 - d. Cap resposta anterior és certa.
73. La mecanoteràpia està contraindicada en:
- a. Osteoartritis.
 - b. Artritis.
 - c. Capsulitis.
 - d. **Fractures recents.**
74. En una marxa en Trendelenburg, quin múscul s'ha de tonificar:
- a. Piramidal.
 - b. **Gluti mig.**
 - c. Adductors.
 - d. Quàdriceps.
75. La pèrdua o anormalitat d'una estructura, funció psicològica, fisiològica o anatòmica, temporal o permanent és una:
- a. Incapacitat.
 - b. Minusvàlua.
 - c. Discapacitat.
 - d. **Deficiència.**
76. És CERT que, la cadència de la marxa:
- a. Augmenta amb l'envelliment.
 - b. No es veu afectada per l'aparició de patologies degeneratives.
 - c. **S'altera amb l'obesitat.**
 - d. La cadència no canvia mai.

77. Quina de les afirmacions següents defineix l'IAS correctament:
- a. L'IAS és una empresa privada
 - b. L'IAS és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya.**
 - c. L'IAS és un consorci sanitari concertat.
 - d. L'IAS és una societat anònima.
78. És FALS que, els indicadors de salut:
- a. Avaluen la política sanitària.
 - b. Avaluen l'estat de salut.
 - c. No tenen en compte les condicions socioeconòmiques.**
 - d. Avaluen les prestacions d'atenció de salut.
79. Per a una atenció sanitària de qualitat, els serveis de salut han de ser:
- a. Equitatius, integrats, eficients i oportuns.**
 - b. Oportuns, integrats i eficients però no equitatius.
 - c. Eficients i equitatius però no integrats.
 - d. Integrats, eficients i equitatius però no oportuns.
80. Respecte les guies de pràctica clínica, és FALS que:
- a. Les guies de pràctica clínica són recomanacions fonamentades en el coneixement científic per a l'abordatge dels principals problemes de salut.
 - b. Estan elaborades per professionals del camp, mitjançant una revisió sistemàtica de les evidències científiques.
 - c. Ajuden als professionals sanitaris i als pacients a respondre a preguntes específiques en el procés de la presa de decisions en determinades circumstàncies sanitàries.
 - d. La fiabilitat i reproductibilitat no es consideren atributs que ha de tenir una guia de practica clínica.**
81. La qualitat assistencial és un element estratègic en el que es fonamenten els sistemes sanitaris actuals cercant:
- a. La millora contínua i l'excel·lència, a partir de la valoració dels punts forts i els punts febles.**
 - b. La millora contínua i l'excel·lència, a partir de la valoració dels punts forts però no té en compte els punts febles.
 - c. La millora contínua i l'excel·lència, a partir de la valoració dels punts febles sense tenir en compte el punts forts.
 - d. La millora contínua, a partir de la comparació dels sistemes assistencials d'un país o regió amb altres sistemes propers geogràficament.
82. L'Aliança per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya és una iniciativa impulsada des de:
- a. Departament de Salut de la Generalitat.**
 - b. Institut d'Assistència Sanitària.
 - c. Ministerio de Salud.
 - d. Organització Mundial de la Salut.

83. És FALS que, l'IAS:

- a. **L'IAS té unes directius pròpies i no segueix les directius establertes en el Pla de Salut de Catalunya.**
- b. Atent a la població en centres i serveis del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, Hospital Santa Caterina, Xarxa de Salut Mental de les Comarques Gironines i Àrees Bàsiques d'Anglès, Breda-Hostalric i Cassà de la Selva.
- c. Proporciona atenció especialitzada, atenció a la salut mental, atenció primària, sociosanitària i social.
- d. La docència i la investigació contribueixen dia a dia a la millorar l'assistència sanitària de l'IAS.

84. La prevalença informa de:

- a. La proporció de casos nous d'una malaltia en un determinat període de temps, respecte a la població exposada a patir-la.
- b. La magnitud de risc de l'efecte d'una malaltia als individus exposats a un factor de risc en relació amb el no exposats.
- c. **La proporció de casos d'una malaltia en un determinat període de temps, respecte a la població existent en la zona objecta d'estudi.**
- d. Les respostes anteriors són falses.

85. Respecte l'accident cerebrovascular, és CERT que s'insistirà especialment en la posició correcta en la cama, en canvis posturals, fisioteràpia respiratòria i mobilització activa de l'hemicòs indemne i passiva del parètic en la:

- a. **Fase 1.**
- b. Fase 2.
- c. Fase 3.
- d. Fase 4.

86. Qui és el màxim responsable de Salut a Catalunya:

- a. El/la Ministre de Sanitat.
- b. **El/la Conseller/a de Salut.**
- c. El Conseller en Cap de la Generalitat.
- d. El President/a de les institucions sanitàries.

87. NO és una característica de la marxa del segador:

- a. **Marxa ràpida.**
- b. Marxa amb el genoll en extensió.
- c. L'extremitat afecta descriu un semicercle.
- d. Braç del costat afecta en semiflexió.

88. Les Àrees Bàsiques de Salut són:

- a. Una altra manera d'anomenar les regions sanitàries.
- b. La manera com s'anomenen a Catalunya les Zones Bàsiques de Salut.
- c. Una altra manera d'anomenar els CAPs.
- d. **Cap de les anteriors és certa.**

89. Quina de les següents opcions és l'àmbit geogràfic de l'IAS:
- a. **La Regió Sanitària de Girona**
 - b. La Regió Sanitària de Girona i del Maresme
 - c. La Regió Sanitària de l'Alt i el Baix Empordà
 - d. La Regió Sanitària de Girona incloent la Cerdanya
90. Per evitar fractures de fèmur per caiguda en el camp de la geriatria s'haurà de treballar prevenció:
- a. **Primària.**
 - b. Secundària.
 - c. Terciària.
 - d. Quaternària.
91. Respecte a l'envelliment del pulmó és FALS que:
- a. El pulmó envellit es denomina pulmó senil.
 - b. **La fisioteràpia respiratòria no té cap efecte.**
 - c. Les vies respiratòries es tanquen fàcilment.
 - d. Pot aparèixer emfisema senil.
92. És CERT que, la promoció de la salut :
- a. **Capacita a les persones per augmentar el control sobre la seva salut i incrementar-la.**
 - b. Ajudar a la població a auto tractar-se.
 - c. Capacita a les institucions però no als individus en el control de la salut.
 - d. Només té en compte a l'individu, però no a les famílies ni l'entorn social.
93. Qui és el màxim responsable de Salut a Catalunya: **PREGUNTA REPETIDA**
- a. El/la Ministre de Sanitat
 - b. El/la Conseller/a de Salut
 - c. El Conseller en Cap de la Generalitat
 - d. El President/a de les institucions sanitàries
94. Quina base de dades és específica del camp de la fisioteràpia:
- a. PubMed
 - b. DOAJ
 - c. **PEDro**
 - d. Scopus
95. La falta de comprensió del llenguatge a conseqüència d'un accident cerebrovascular es denomina:
- a. **Afàsia de Wernicke.**
 - b. Afàsia de Broca.
 - c. Afàsia e conducció.
 - d. Afàsia motora.
96. Respecte la presència de dolor en el peu diabètic, és FALS que:
- a. S'evitaran mobilitzacions forçades de les articulacions del peu .
 - b. No s'aplicaran pressions inadequades.
 - c. Es vigilarà la humitat del peu.
 - d. **Està indicat l'ús de qualsevol tipus de termoteràpia.**

97. Quina escala valora marxa i equilibri:

- a. Barthel.
- b. Tinetti.**
- c. Borg.
- d. Beck.

98. El síndrome de Guyon afecta al nervi:

- a. Cubital.**
- b. Radial.
- c. Ciàtic.
- d. Frènic.

99. L'efecte de cavitació és característic del:

- a. Ultrasò.**
- b. Massatge.
- c. Exercici.
- d. Cap dels anteriors.

100. La malaltia de Parkinson cursa amb marxa:

- a. Festinant.**
- b. Trendelenburg.
- c. En estepatge.
- d. Atàxica.

PREGUNTES RESERVA

1R. Respecte a la luxació escapulohumeral, és CERT que:

- a. En un luxació anterior s'han d'evitar el desplaçament anterior i inferior del cap de l'húmer.**
- b. La propiocepció escapulohumeral no s'utilitza en aquest tipus de luxació.
- c. En una luxació anterior estan indicats els exercicis de Codman.
- d. La més freqüent és la luxació posterior.

2R. L'articulació occipitoatlantoidea és una palanca de:

- a. Primer gènere.**
- b. Segon gènere.
- c. Tercer gènere.
- d. Quart gènere.

3R. Quin mètode NO correspon al drenatge limfàtic manual:

- a. Földi.
- b. Leduc.
- c. Vodder.
- d. Dicke.**

4R. Quina de les següents tècniques de massatge és la menys indicada en el camp de la geriatria:

- a. Fregament superficial.
- b. Fregament profund.
- c. Pressions.
- d. Friccions.**

5R. Respecte l'ancià fràgil, és FALS que presenti una major probabilitat de:

- a. Hospitalització.
- b. Òptima recuperació en les fractures de fèmur.**
- c. Caigudes.
- d. Mort.

6R. Un símptoma és:

- a. Objectiu.
- b. Subjectiu.**
- c. Es pot observar amb una radiologia.
- d. Sinònim de síndrome.