

PROVA CONEIXEMENTS D' AUXILIARS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE LA
CONVOCATÒRIA OBERTA D'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DE L'IAS
Referència 2019/1010

Normes de l'examen

- La prova consta de un examen de 100 preguntes tipus test i un full de respostes.
- S'ha de retornar el test conjuntament amb el full de respostes.
- En el full de respostes ha de constar el DNI, nom i signatura.
- En cada pregunta només hi ha una resposta correcta.
- Cal marcar clarament la casella corresponent a la resposta. En cas de dubte no es valorarà la pregunta.
- Les respostes incorrectes tenen una penalització tova, és a dir per cada pregunta errònia desconta 0.25 punts mentre que cada pregunta correcta suma 1 punt.

1. Les sigles IAS volen dir:

- a. Institució d'Assistència Sanitària.
- b. Institut d'Assistència Sanitària.**
- c. Institut d'Assistència Sociosanitària.
- d. Institució d'Assistència Sociosanitària.

2. La plantilla de l'IAS és:

- a. D'uns 2000 treballadors.
- b. D'uns 1500 treballadors.**
- c. D'uns 2500 treballadors.
- d. D'uns 1000 treballadors.

3. Indica quina de les següents frases és certa respecte a la relació entre l'IAS i l'ICS Girona:

- a. El conveni estableix la fusió total de les dues institucions.
- b. El conveni preserva la independència de les dues institucions.**
- c. El conveni estableix la fusió parcial de les dues institucions.
- d. No existeix aquest conveni.

4. Si classifiquem els hospitals en funció del tipus de pacients atesos, diferenciem entre:

- a. Hospitals generals i hospitals especialitzats o monogràfics.
- b. Hospitals de baixa complexitat, hospitals de complexitat mitjana i hospitals d'alta tecnologia.
- c. Hospitals d'aguts i hospitals de crònics.
- d. Totes les anteriors són certes.**

5. A l'EAP o Equip d'Atenció Primària hi trobem:

- a. Metges de família, pediatres, infermeres i auxiliars exclusivament.
- b. Metges de família, pediatres i infermeres exclusivament.
- c. Metges de família, pediatres, infermeres, auxiliars i farmacèutics entre d'altres.
- d. Metges de família, pediatres, infermeres, auxiliars i gerents de les instal·lacions entre d'altres.

6. Les Àrees Bàsiques de Salut són:

- a. Una altra manera d'anomenar les regions sanitàries.
- b. La manera com s'anomenen a Catalunya les Zones Bàsiques de Salut.
- c. Una altra manera d'anomenar els CAPs.
- d. Cap de les anteriors és certa.

7. Respecte a l'Atenció primària és cert que:

- a. Constitueix el primer nivell al qual han de recórrer els usuaris quan tenen un problema de salut.
- b. És el principal responsable de les actuacions de prevenció de problemes de salut.
- c. Presta assistència sanitària de caràcter general tant a la consulta com al domicili del pacient,
- d. Totes són certes.

8. Un principi ètic bàsic i inqüestionable és:

- a. Tota activitat sanitària s'ha d'enmarcar en la defensa de la vida humana per sobre de qualsevol altra consideració.
- b. Tota activitat sanitària s'ha d'enmarcar en la legislació vigent.
- c. Tota activitat sanitària s'ha d'enmarcar en la presa de decisions.
- d. Tota activitat sanitària s'ha d'enmarcar en la defensa de la dignitat humana.

9. Si en el nostre torn entra per urgències un familiar:

- a. Si està conscient podem avisar a tota la família sense necessitat del permís d'aquest pacient.
- b. Si està conscient necessitem el permís d'aquest pacient per poder avisar als familiars.
- c. Cal que truquem de seguida a la família per avisar-los de la situació i del motiu de l'atenció.
- d. Si està conscient podem signar nosaltres els fulls de consentiment informat en nom seu, per això som familiars i tenim coneixements mèdics.

10. Entre les funcions del TCAI NO hi ha:

- a. Realitzar la higiene a un pacient dependent.
- b. Col·locar una via.
- c. Realitzar la neteja i desinfecció de l'instrumental.
- d. Donar el menjar a aquelles persones que no puguin menjar per si soles.

11. La gràfica de signes vitals:

- a. És un document sanitari.
- b. És un document clínic.
- c. Forma part de la HCH.
- d. Totes són certes.

12. El consentiment informat:

- a. Sempre serà verbal
- b. Pot ser verbal però obligatòriament haurà de ser escrit per a les intervencions quirúrgiques i per als procediments diagnòstics o terapèutics invasius.
- c. Pot ser verbal o escrit segons l'organització de cada centre.
- d. Sempre serà escrit.

13. Quin dels següents NO és documentació sanitària:

- a. Petició de material sanitari al magatzem.
- b. Full d'ingrés.
- c. Carta comercial.
- d. Full de dietes.

14. Les substàncies utilitzades per a fer quimioteràpia suposen per al personal un risc:

- a. Biològic.
- b. Químic.
- c. Radiològic.
- d. No suposen cap risc per al personal.

15. Per tal de prevenir els riscos derivats de radiacions, si hem d'acompanyar un pacient dependent a fer-se una radiografia, ens haurem de posar:

- a. Una bata d'aïllament.
- b. No cal cap precaució especial, ja que és un fet puntual i no habitual.
- c. Un davantal plomat.
- d. Un davantal plàstic i impermeable.

16. La Covid-19 és una malaltia causada per:

- a. Un bacteri.
- b. Un virus.
- c. Un fong.
- d. Un paràsit.

17. Respecte a les mascaretes és cert que:

- a. Totes protegeixen tant al qui les porta com als altres davant aquelles malalties que es transmeten per aire.
- b. Les mascaretes FFP2 protegeixen tant al qui les porta com als altres, enfront aquelles malalties que es transmeten per aire.
- c. Les mascaretes quirúrgiques protegeixen tant al qui les porta com als altres, enfront aquelles malalties que es transmeten per aire.
- d. Les mascaretes FFP2 protegeixen exclusivament a qui la porta enfront aquelles malalties que es transmeten per aire.

18. Els **principals mecanismes de transmissió de les infeccions nosocomials són:**

- a. Les mans del personal sanitari.
- b. Els vectors.
- c. Les gotes de saliva.
- d. Els microorganismes transmesos a través de materials.

19. El **rentat higiènic de mans:**

- a. Es realitza amb sabó líquid.
- b. Es realitza amb sabó líquid antisèptic.
- c. Es realitza amb sabó líquid alcohol·lic.
- d. Es realitza amb sabó líquid esterilitzant.

20. **Quin d'aquests aïllaments no existeix:**

- a. Evitar la transmissió per aire i gotes.
- b. Evitar la transmissió per contacte i aire.
- c. Evitar la transmissió per contacte i gotes.
- d. Evitar la transmissió per aire.

21. **En els aïllaments per gotes i per contacte i gotes la porta:**

- a. Ha d'estar tancada.
- b. Ha d'estar oberta.
- c. Pot estar oberta.
- d. Depèn del pacient.

22. **L'esterilització amb plasma:**

- a. Genera residus tòxics i per tant hem d'anar amb compte quan retirem el material de la màquina.
- b. Utilitza els mateixos envasos (bosses d'empaquetar) que l'esterilització amb autoclau.
- c. És molt útil però no permet utilitzar controls d'esterilització.
- d. És un sistema eficaç i permet esterilitzar una gran diversitat de materials.

23. **Els controls d'esterilització que ens donen una certesa total i absoluta de què el material està completament esterilitzat són:**

- a. Els controls biològics.
- b. Els controls químics.
- c. Els controls físics.
- d. Tots ells.

24. **Quan traiem el material de l'autoclau:**

- a. Cal que en comprovem els controls d'esterilització i el bon estat dels paquets abans d'emmagatzemar-los.
- b. L'emmagatzemem directament sense fer-hi cap control.
- c. Només hem de comprovar el bon estat dels paquets.
- d. Si durant el procés no ha sonat cap alarma, el podem emmagatzemar.

25. **Els antibiòtics serveixen per:**

- a. Tractar tota mena de malalties infeccioses.
- b. Tractar malalties víriques i bacterianes exclusivament.
- c. Tractar malalties víriques exclusivament.
- d. Tractar malalties bacterianes exclusivament.

26. Indica quina és la definició d'unitat del pacient:

- a. Espai, mobiliari i utensilis utilitzats pel pacient durant la seva estada en un centre sanitari o sociosanitari.
- b. Mobiliari utilitzat pel pacient durant la seva estada en un centre sanitari o sociosanitari.
- c. És un terme equivalent a habitació hospitalària.
- d. Documents del pacient que s'inclouen en la seva història clínica.

27. L'habitació hospitalària ha d'estar a una temperatura:

- a. D'entre 26-28°C a l'estiu i 19-20 a l'hivern.
- b. Dependrà de les condicions i les característiques de l'hospital.
- c. D'entre 22 i 26°C.
- d. D'entre 25 i 30°C.

28. Una persona que es troba en un estat terminal:

- a. Estarà sempre en una habitació compartida perquè no estigui mai sola.
- b. Estarà en una habitació compartida amb algun altre malalt terminal.
- c. Sempre que sigui possible estarà en una habitació d'ús individual.
- d. Estarà sempre a la UVI.

29. En una habitació on hi ha dos llits:

- a. Hi ha una única unitat del pacient.
- b. Hi ha dues unitats del pacient.
- c. Hi haurà cap, una o dues unitats del pacient segons quants dels llits estiguin ocupats.
- d. Cap de les anteriors és certa.

30. El desgast físic, emocional i mental per involucrar-se massa en la feina durant un temps prolongat s'anomena:

- a. Síndrome de Mauthausen.
- b. Síndrome del Burnout.
- c. Síndrome de l'estrès perllongat.
- d. Traumatisme vicari.

31. El llit que s'utilitza per a grans cremats és el:

- a. Clinitron o de levitació.
- b. Rototest
- c. Llit d'aigua
- d. Llit de Judet

32. Quines necessitats jerarquitzava la teoria psicològica de la piràmide de Maslow?

- a. Necessitats fisiològiques, de seguretat i protecció, socials, d'estima i autorealització.
- b. Necessitats emotives, sensorials i motivacionals.
- c. Necessitats bàsiques d'amor, pertinença, alimentació, sexe i descans.
- d. Necessitats de moralitat, creativitat, reconeixement i èxit.

33. Una Úlcera per pressió en grau II és aquella en que:

- a. L'epidermis i/o la dermis estan destruïdes. Es visualitzen com una erosió o un cràter superficial.
- b. Ni la dermis ni l'epidermis no estan destruïdes. Es visualitzen com un eritema superficial.
- c. L'epidermis i la dermis estan destruïdes i la destrucció arriba també a la capa subcutània. Es visualitzen com un cràter profund amb exsudat.
- d. Tota la capa cutània està destruïda i apareixen estructures subcutànies afectades. Es visualitza com un cràter profund i extens amb excavacions i necrosis tissular.

34. Quins nervis s'encarreguen de la contracció dels músculs esquelètics?

- a. Nervis sensitius.
- b. Nervis motors.
- c. Nervis motrius.
- d. Nervis contràctils.

35. En un adult la RCP comença amb:

- a. Dues insuflacions
- b. 30 compressions
- c. Una insuflació i després 30 compressions
- d. Depèn del cas

36. En la RCP les compressions s'han de fer a un ritme de:

- a. És indiferent.
- b. Tan ràpidament com puguem.
- c. Entre 100 i 120 compressions per minut
- d. Entre 60 i 80 compressions per minut

37. A quin tram del tub digestiu desemboca el colèdoc?

- a. Duodè.
- b. Cec.
- c. Colon.
- d. Recte.

38. Què significa el terme hemoptisi?

- a. Presència de sang a l'orina.
- b. Presència de sang en les femtes.
- c. Sortida de sang per la boca procedent de l'aparell respiratori.
- d. Sortida de sang per la boca procedent de l'aparell digestiu.

39. La vena safena es troba a:

- a. El coll
- b. L'avantbraç
- c. Les cames
- d. El tòrax

40. La pèrdua total de la capacitat olfactiva s'anomena:

- a. Hipoòsmia
- b. Anòsmia
- c. Agèusia
- d. Agèusia

41. En relació a l'acòlia :

- a. És una patologia deguda a una manca de secreció de bilis
- b. Dona femtes sense pigmentació
- c. Pot ser deguda a una obstrucció de la vesícula biliar.
- d. Totes són certes.

42. L'epilèpsia és:

- a. Un esclat d'activitat neural anormal, que causa convulsions
- b. Una lesió permanent, però no progressiva
- c. Una malaltia molt comuna
- d. Un accident que se sol donar preferentment en persones adultes

43. Quin nom reben els vasos circulatòris que aporten sang oxigenada al miocardi:

- a. Artèries Caròtides
- b. Artèries Miocardiques
- c. Artèries Coronàries
- d. Artèries Pulmonars

44. En una persona amb risc elevat de patir UPP els canvis posturals els farem:

- a. Durant el dia sempre cada dues hores..
- b. Com a mínim un cop cada quatre hores.
- c. Generalment cada quatre hores però a la nit podem fer-los cada vuit hores per no interrompre el son.
- d. Sempre cada 6 hores.

45. L'accessori de llit que serveix per evitar el pes i el fregament de la roba de llit sobre la pell del pacient és:

- a. El triangle de llit
- b. El suport de peus
- c. L'arc metàl·lic
- d. La barana de seguretat

46. Per ajudar-nos a fer els canvis posturals podem utilitzar:

- a. Una fusta lliscant
- b. El llençol travesser
- c. Una grua
- d. Totes són correctes

47. La piroisi és:

- a. Un dolor agut, intens i intermitent
- b. Una sensació de coïssor, cremor o acidesa a la zona de l'esòfag
- c. Una coloració groguenca de la pell
- d. Una alteració del trànsit intestinal

48. Quina de les següents NO és una funció del teixit epitelial:

- a. La secreció de substàncies
- b. L'excreció de substàncies
- c. El transport de substàncies
- d. L'absorció de substàncies

49. L'alcohol i el tabac NO són desencadenants de:

- a. Gastritis aguda
- b. Càncer gàstric
- c. Úlcera gàstrica
- d. Hepatitis A

50. Per obrir la via aèria:

- a. Introduïrem els dits dins la boca de la víctima per obrir-la millor.
- b. Agafarem la víctima per la barbeta estirant cap avall per obrir-la millor.
- c. Estirarem el front cap enrere amb una mà i amb l'altra el mentó o barbeta cap avall.
- d. Amb 2 dits d'una mà estirarem el mentó cap amunt i amb l'altra mà el front cap enrere i avall.

51. Què significa el terme "malaltia isquèmica"?

- a. Que una de les vàlvules del cor no deixa passar la sang cap al ventricle
- b. Que s'ha trencat un vas sanguini
- c. Que no es produeix la contracció auricular
- d. Que s'ha obstruït un vas sanguini i els teixits no reben sang oxigenada

52. Les glàndules mamàries fabriquen llet per l'acció de l'hormona:

- a. Prolactina
- b. Tiroxina
- c. Cortisol
- d. Adrenalina

53. La dieta líquida és aquella;

- a. Que s'utilitza durant les 12h anteriors a una anestesia general
- b. En què el pacient només pot beure aigua
- c. És aquella en què el pacient pot ingerir tot tipus de líquids clars (aigua, infusions, brous) i menjar gelatina.
- d. a i c són certes

54. La hipoglucèmia pot cursar com a:

- a. Nerviosisme, angoixa, sensació de gana, sudoració i taquicàrdia.
- b. Edema bimal-leolar a les extremitats inferiors.
- c. Manca d'insulina.
- d. Petèquies a esquena i torax.

55. Quines són les fases de l'assistència perioperatòria:

- a. Operatòria i cirurgia.
- b. Cirurgia Ortopèdia i traumatologia.
- c. Preoperatòria, Operatòria i Postoperatòria.
- d. Preoperatòria, Operatòria i Posologia.

56. Segons la finalitat general, la cirurgia diagnòstica és:

- a. La que es realitza per determinar l'extensió d'un procés patològic.
- b. La que es realitza per extirpar un tumor maligne.
- c. La que es realitza per extirpar un tumor benigne.
- d. La que ajuda al metge a establir un diagnòstic.

57. Quan fem un llit:

- a. Haurem de procurar que el llençol de sota quedi ben pla i sense arrugues per evitar fregaments amb la pell del pacient.
- b. si el pacient que l'ocupa té problemes de mobilitat haurem de deixar el llit obert.
- c. Cal que deixem el carro de roba fora de l'habitació.
- d. Totes són certes.

58. El rasurat fins ara ha estat una tècnica imprescindible, però:

- a. És l'únic procediment preoperatori vàlid avui dia.
- b. El procediment actual es fa amb crema depilatoria.
- c. Serà el cirurgià el que valorarà el rasurat, i així ho indicarà.
- d. Sempre es rasura un cop feta la intervenció per evitar microabrasions.

59. Les tasques de les Tècniques Auxiliars de Cures Infermeres a quiròfan són:

- a. Recollir, netejar, classificar, reposar, desinfectar i esterilitzar el material.
- b. Rentar les mans al cirurgià i l'anestèsista.
- c. Canalitzar una via venosa amb un catèter del núm. 14.
- d. Monitorar el ventilador.

60. La broncoaspiració:

- a. És un problema que pot aparèixer quan fem una aspiració de secrecions d'una traqueotomia, si introduïm massa la sonda d'aspiració.
- b. És un dels problemes importants que es poden donar en un pacient que pateix disfàgia en especial quan ha d'ingerir líquids.
- c. Per evitar-la es poden administrar espessants juntament amb els aliments líquids
- d. b i c són certes

61. Les pinces de Kocher, de Pean i de Crile són instrumental de:

- a. Dissecció.
- b. Exposició.
- c. Sutura.
- d. Hemostàsia.

62. En un pacient en decúbit supí li poden aparèixer úlceres per pressió:

- a. Al sacre, als talons, als colzes i als trocànters.
- b. Al sacre, als talons, als colzes i a la cresta iliaca.
- c. Al sacre, als talons, als colzes i als mal·leols.
- d. Al sacre, als talons, als colzes i a l'occipital.

63. Una de les mesures terapèutiques que cal aplicar a una mare en el puerperi immediat, en cas de presentar-se una mastitis és:

- a. Embenat compressiu de les mames.
- b. Aplicació de suaus massatges de dins cap a fora a les mames.
- c. Aplicació de compreses gelades.
- d. a i b són correctes.

64. L'aparell reproductor femení consta dels següents òrgans excepte:

- a. Ovaris.
- b. Trompes de Fal·lopi.
- c. Vagina.
- d. Meat.

65. Quina posició corporal s'utilitza en pacients sotmesos a operacions pelvianes o que han patit una lipotímia?

- a. Posició Fowler.
- a. Antitrendelenburg.
- b. Posició de Sims o semiprona.
- c. Trendelenburg.

66. Com s'anomena l'avortament que té lloc dins l'úter abans de la setmana 22 de gestació, en el qual l'embrió queda retingut durant un període llarg de temps:

- a. Avortament sèptic
- b. Avortament retingut
- c. Avortament complet
- d. Amenaça d'avortament

- 67. Si hem de fer un canvi postural de decúbit supí a decúbt lateral:**
- Sempre ho haurem de fer entre dues persones.
 - Primer haurem de fer un desplaçament de la persona cap a la vora del llit.
 - Avisarem al personal zelador perquè ho facin.
 - Totes són falses
- 68. L'anúria:**
- És una disminució en la quantitat d'orina.
 - És l'absència de secreció urinària.
 - És l'augment en la quantitat d'orina.
 - És la no formació d'orina
- 69. En una persona amb oxigenoteràpia amb mascareta venturi caldrà vigilar:**
- La tolerància al sistema d'administració.
 - La sequedat dels llavis i la mucosa bucal.
 - La formació de possibles irritacions o upp als pòmuls, al pont del nas i sobre els pavellons auditius.
 - Totes són certes.
- 70. Indica quina de les següents situacions no són la causa de la hipoglucèmia en una persona diabètica:**
- Consum suficient d'aliments
 - Exercici físic intens
 - Retard en la ingesta d'aliments
 - Error en l'administració d'insulina
- 71. S'anomena part a terme aquell que es produeix:**
- Entre la setmana 37 i 42 de gestació
 - En un hospital
 - Quan el nadó pesa més de 2500 grams de pes
 - Totes són certes
- 72. En el suport que el personal sanitari ha de donar a la persona o persones cuidadores s'hi inclou:**
- La realització d'una valoració per conèixer com ha afectat la malaltia al cuidador i familiars.
 - Afavorir la comunicació entre la família i el pacient per evitar actituds de negació de la malaltia i per permetre l'exteriorització dels sentiments.
 - Donar suport per ajudar a expressar les emocions i dubtes.
 - Totes són certes
- 73. Les fases del dol són:**
- Shock, protesta, desorganització i reorganització
 - Emocionals, psicològiques, cognitives i conductuals
 - Externes, internes, personals i col·lectives
 - Totes són falses
- 74. Indica quina de les següents afirmacions és falsa pel que fa als conflictes en l'entorn de treball:**
- De l'existència de conflicte és possible treure'n beneficis per a l'organització.
 - Sempre es pot evitar l'aparició de conflictes en l'entorn laboral si es fa una bona planificació.
 - Les organitzacions han d'intentar tenir un nivell òptim de conflicte.
 - Els conflictes poden mostrar els canvis que cal fer en una organització.

75. Pel que fa a l'educació per la salut és cert que:

- a. Només el personal sanitari pot actuar com a agent de salut.
- b. Només el personal educatiu i el sanitari poden actuar com a agents de salut.
- c. Qualsevol persona amb uns mínims coneixements de salut pot actuar com a agent de salut.
- d. Només el personal mèdic i d'infermeria pot actuar com a agent de salut.

76. Educar un adolescent diabetic per tal que tingui un bon control de la seva malaltia i un estil de vida saludable, correspon a:

- a. Promoció de la salut.
- b. Prevenció primària.
- c. Prevenció secundària.
- d. Prevenció terciària.

77. En general són pacients fràgils:

- a. Tots els pacients de més de 80 anys.
- b. Els pacients d'edat avançada (75 anys o més) anys amb un baix pes i amb patologies cròniques més o menys discapacitants.
- c. Qualsevol pacient que per la seva situació clínica tingui un grau elevat de risc de caigudes.
- d. Totes són certes.

78. Una de les complicacions més greus de l'administració d'aliments per sonda nasogàstrica és:

- a. Nàusees.
- b. Diarrea.
- c. Perforació del colon sigmoide.
- d. Broncoaspiració.

79. Una dieta astringent és una dieta:

- a. Pobra en residus.
- b. Hipercalòrica.
- c. Laxant.
- d. Líquida

80. En el procediment per a canviar un apòsit:

- a. Ens rentarem les mans, explicarem al pacient el que li farem i ens col·locarem els guants estèrils.
- b. Ens rentarem les mans, explicarem al pacient el que li farem i ens col·locarem els guants d'un sol ús.
- c. Ens rentarem les mans, no explicarem al pacient el que li farem i ens col·locarem els guants estèrils.
- d. Ens rentarem les mans, no explicarem al pacient el que li farem i ens col·locarem els guants d'un sol ús.

81. Els ènemes opacs s'utilitzen:

- a. Per introduir fàrmacs, amb finalitat terapèutica.
- b. Per ajudar a l'evacuació en pacients amb fecalomes.
- c. Per netejar el còlon, abans d'una colonoscòpia.
- d. Amb finalitats diagnòstiques, per realitzar una radiografia.

82. Quina tècnica no s'ha d'utilitzar mai per comprovar si la sonda nasogàstrica s'ha col·locat correctament:

- a. Aspirar contingut gàstric.
- b. Injectar aire amb una xeringa i auscultar l'epigastri amb un fonendoscopi.
- c. Injectar aigua amb una xeringa i auscultar l'epigastri amb un fonendoscopi.
- d. Fer una radiografia.

83. Les sondes Foley:

- a. Són flexibles i poden tenir dos o tres llums en el seu interior.
- b. Són flexibles amb una sola llum per evacuar l'orina.
- c. Són rígides i permeten evacuar l'orina quan hi ha retenció urinària.
- d. Es fixa amb un punt de sutura a la paret abdominal.

84. Respecte al sondatge vesical:

- a. Permet el buidatge de la bufeta de manera controlada en pacients que han perdut el control de la micció.
- b. La col·locació i el manteniment de la sonda és una de les tasques principals dels auxiliars en el postoperatori.
- c. És preferible a l'ús de bolquers.
- d. Totes les respostes són correctes.

85. Una dieta hipoproteïca és adequada per:

- a. Durant el postpart immediat, especialment si la dona és lactant.
- a. Pacients amb nivells elevats d'àcid úric en sang o amb problemes renals.
- b. En tots els preoperatoris.
- c. Totes són certes.

86. Quin dels següents no es considera un sistema obert d'administració d'oxigen?

- a. Mascareta Venturi.
- b. Campana d'oxigen.
- c. Ulleres nasals.
- d. Catèter nasofaringi.

87. El tub de Guedel s'utilitza en el protocol de:

- a. Sondatge vesical.
- b. Sondatge nasogàstric.
- c. Intubació endotraqueal.
- d. Neteja de la cànula de traqueostomia.

88. L'ordre correcte dels dispositius per l'administració d'oxigenoteràpia és:

- a. Bombona d'oxigen-humidificador-cabalímetre-manòmetre.
- b. Bombona d'oxigen-manòmetre-humidificador-cabalímetre.
- c. Bombona d'oxigen-manòmetre-cabalímetre-humidificador.
- d. Cap de les anteriors.

89. Es considera ventilació assistida la utilització de:

- a. Ambú.
- b. Ulleres nasals.
- c. Mascareta de concentració graduable.
- d. Totes les respostes són correctes.

90. Digues quina de les afirmacions és correcta respecte a l'alimentació enteral:

- a. La sonda s'insereix a través de la fosa nasal, passa per la faringe-tràquea-esòfag fins a arribar a l'estómac.
- b. A la via endovenosa se subministren els nutrients necessaris en una solució aquosa estèril.
- c. Se subministra l'aliment amb bomba d'infusió de manera que el flux d'aliments és constant i continu.
- d. Per la sonda es poden introduir aliments, fàrmacs o solució de rentat gàstric.

91. Per la col·locació de quin tipus de sonda posem el pacient en decúbit lateral dret?

- a. Sonda vesical.
- b. Sonda nasogàstrica.
- c. Sonda rectal.
- d. Sonda enterica.

- 92. Pel sondatge nasogàstric, el personal sanitari:**
- Porta guants d'un sol ús.
 - Porta guants estèrils d'un sol ús.
 - No cal portar guants, una higiene correcta de les mans és suficient.
 - Només cal que l'infermer/a porti guants estèrils, l'auxiliar només ha de portar guants d'un sol ús.
- 93. Per realitzar una dutxa correcta cal:**
- Mullar el cos amb aigua freda per activar la circulació sanguínia.
 - Acabar la dutxa amb aigua calenta per obrir els porus de la pell.
 - Aclarir amb aigua abundant.
 - Alternar aigua calenta i freda per activar la circulació sanguínia.
- 94. És una finalitat del procés de la higiene del pacient:**
- Observar i detectar zones de la pell que puguin estar alterades.
 - Eliminar secrecions corporals i disminuir el creixement bacterià.
 - Estimular la circulació sanguínia.
 - Totes són correctes.
- 95. El rentat genital d'un pacient enllitat es realitza:**
- De dalt a baix i de dins a fora.
 - De baix a dalt i de fora a dins.
 - De dalt a baix i de fora a dins.
 - De baix a dalt i de dins a fora.
- 96. Respecte al rentat de cabell és correcte que:**
- El pacient enllitat cal posar-lo en la posició de Roser.
 - Aplicar flocs a les orelles.
 - Retirar el capçal del llit.
 - Totes són correctes.
- 97. Digues quin d'aquests efectes NO és produït per la immobilització a llarg termini:**
- Augment de la probabilitat de patir embòlies pulmonars.
 - Augment de la probabilitat de patir restrenyiment.
 - Augment de la probabilitat de patir atrofia muscular.
 - Augment de la probabilitat de patir insuficiència renal aguda.
- 98. La posició corporal en decúbit supí, quan tenim el cap més baix que els peus s'anomena:**
- Posició Fowler
 - Trendelenburg.
 - Posició de Sims o semiprona.
 - Antitrendelenburg
- 99. Respecte a la fusta lliscant:**
- La farà servir l'auxiliar quan ha de realitzar una mobilització sense ajuda
 - Permet transferir el pacient del llit a la cadira de rodes.
 - S'utilitza per transferir el pacient del llit a la llitera i viceversa.
 - S'ha d'adaptar la seva extensió al tòrax i abdomen del pacient.

100. Són signes imminents de mort:

- a. Augment de la sudoració, calenta i enganxosa. Respiració lenta pols lent i dèbil.
- b. Disminució de la sudoració. Respiració lenta pols lent i dèbil.
- c. Augment de la sudoració, freda i enganxosa. Respiració lenta pols ràpid i dèbil.
- d. Disminució de la sudoració, enganxosa. Respiració lenta pols lent i dèbil.

Preguntes de reserva:

A. Entre les fonts d'infecció de les infeccions nosocomials hi ha:

- a. Les mans del personal sanitari
- b. Els pacients portadors o asimptomàtics
- c. L'ús de catèters
- d. Les gotes de saliva

B. Respecte al Sistema Nerviós:

- a. El Central comprèn l'encèfal i la medulla espinal.
- b. El Central comprèn l'encèfal i dotze parells de nervis més.
- c. El Central comprèn el somàtic i trenta-un parells de nervis.
- d. Cap resposta anterior és correcta.