

**RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS DE LES PROVES DE CONEIXEMENTS DE LA CONVOCATÒRIA
OBERTA D'OFERTA PÚBLICA D'Ocupació DEL GRUP PROFESSIONAL 2 DE L'IAS**

(Referència 2022/1010)

PREGUNTES GENÈRIQUES IAS

Es resol **anul·lar** la següent pregunta en totes les proves de coneixements que hi consta la següent pregunta:

Les Àrees Bàsiques de Salut són:

- a) Una altra manera d'anomenar les regions sanitàries
- b) La manera com s'anomenen a Catalunya les Zones Bàsiques de Salut
- c) Una altra manera d'anomenar els CAPs
- d) Cap de les anteriors és certa

Es resol **NO anul·lar** la següent pregunta en totes les proves de coneixements que hi consta la següent pregunta:

Quina de les següents opcions és l'àmbit geogràfic de l'IAS:

- a) **La Regió Sanitària de Girona**
- b) La Regió Sanitària de Girona i del Maresme
- c) La Regió Sanitària de l'Alt i el Baix Empordà
- d) La Regió Sanitària de Girona incloent la Cerdanya

PROVA D'INFERMERIA XARXA DE SALUT MENTAL

11. És cert sobre el TDAH...

- a) Les persones amb TDAH presenten inatenció, impulsivitat i hiperactivitat
- b) Els nens amb mala salut tenen més del doble de probabilitats de tenir TDAH (21% vs 8%)
- c) La mitjana d'edat a l'inici és als 7 anys i el TDAH en adults s'observa en un 5% de la població
- d) **Totes són certes**

S'ACCEPTA LA RECLAMACIÓ I S'ANUL·LA LA PREGUNTA

14. Els efectes adversos a curt termini del consum de cànnabis són:

- a) Alteració del desenvolupament cerebral
- b) **Dificultat d'aprenentatge, deteriorament de la coordinació motora i desenvolupament de paranoia i psicosi**
- c) Ansietat, pèrdua de la gana, irritabilitat i injecció conjuntival
- d) Abandonament escolar, bronquitis crònica i pitjor satisfacció global

S'ACCEPTA LA RECLAMACIÓ I S'ANUL·LA LA PREGUNTA

18. La cocaïna es pot consumir per via:

- a) Intranasal, fumada i endovenosa
- b) Intranasal i fumada
- c) **Intranasal, fumada, endovenosa, oral, rectal i intravaginal**
- d) Intranasal i endovenosa

NO S'ACCEPTA LA RECLAMACIÓ I NO S'ANUL·LA LA PREGUNTA

60. Quin dels següents procediments és incorrecte per demanar visita a un centre d'atenció primària?

- a) Mitjançant una instància
- b) Personalment
- c) Per telèfon
- d) **A la majoria dels CAP també per Internet**

S'ACCEPTA LA RECLAMACIÓ I S'ANUL·LA LA PREGUNTA

PROVA DE LLEVADORES D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA

CAS 1 – PREGUNTA 2

Mentre realitzem el control de monitoratge fetal (RCTG) la dona refereix dolor abdominal. Segons la Dinàmica Uterina que mostra l'RCTG i el dolor referit, li oferim realitzar un Tacte Vaginal per comprovar si està de part. Quines característiques de dilatació i dinàmica uterina serien considerades part actiu i per tant criteri d'ingrés?

- a) Cx igual o superior a 3 cm de dilatació, esborrat 50%, centrant-se, consistència mitja, presentació cefàlica insinuada, amb contraccions irregulars de baixa intensitat cada 20 minuts.
- b) Cx igual o superior a 4 cm de dilatació, esborrat 60%, centrat, consistència mitja, presentació cefàlica lliure, amb contraccions irregulars de baixa intensitat cada 20 minuts.
- c) **Cx igual o superior a 2 cm de dilatació, esborrat 50%, centrat, consistència tova, presentació cefàlica insinuada, amb 2 contraccions rítmiques i progressives de mitjana intensitat cada 10 minuts.**
- d) Cx igual a 1 cm dilatació, esborrat 90%, centrat, consistència tova, presentació cefàlica insinuada, amb 2 contraccions rítmiques i progressives de mitjana intensitat cada 10 minuts.

NO S'ACCEPTA LA RECLAMACIÓ I NO S'ANUL·LA LA PREGUNTA

CAS 1 – PREGUNTA 6

Segons les troballes referents al monitor anterior, selecciona la resposta correcta referent a la valoració d'aquest i el procediment a seguir:

- a) RCTG tranquil·litzador sense dinàmica uterina, constants maternes estables. Alta a domicili.
- b) **RCTG tranquil·litzador sense dinàmica uterina, control de pressió arterial ja que la pressió arterial està alterada. Realitzar proves o screening per descartar pre-Eclàmpsia.**
- c) RCTG no tranquil·litzador sense dinàmica uterina, control de pressió arterial ja que pressió arterial alterada. Realitzar entre 20 i 40 minuts més de RCTG per valorar si pot anar d'alta a domicili.
- d) RCTG no tranquil·litzador sense dinàmica uterina, control de pressió arterial, ja que pressió arterial alterada. Ingrés per inducció de part.

NO S'ACCEPTA LA RECLAMACIÓ I NO S'ANUL·LA LA PREGUNTA

PREGUNTA Nº 26

Quina és la seqüència recomanada d'actuació en un pacient que ha patit una parada cardiorespiratòria?

- a) Comprovar la resposta, trucar a l'ambulància, iniciar la RCP, aplicar el desfibril·lador
- b) Trucar a l'ambulància, comprovar la resposta, iniciar la RCP, aplicar el desfibril·lador**
- c) Iniciar la RCP, comprovar la resposta, trucar a l'ambulància, aplicar el desfibril·lador
- d) Iniciar la RCP, trucar a l'ambulància, comprovar la resposta, aplicar el desfibril·lador

S'ACCEPTA LA RECLAMACIÓ I S'ANUL·LA LA PREGUNTA

PROVA D'INFERMERIA D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA

10. Quins objectius de salut té en compte el Pla de Salut de Catalunya 2021-2025?

- a) Els generals de l'estat de salut, la reducció del risc, la morbiditat, la mortalitat i la qualitat de serveis**
- b) Els generals de l'estat de salut, la morbiditat, la mortalitat i la qualitat de serveis
- c) La reducció del risc, la morbiditat, la mortalitat i la qualitat de serveis
- d) Els generals de l'estat de salut, la reducció del risc, la mortalitat i la qualitat de serveis

S'ACCEPTA LA RECLAMACIÓ I S'ANUL·LA LA PREGUNTA

11. Quines són les estratègies del Pla de Salut de Catalunya 2021-2025?

- a) Els entorns saludables, la igualtat d'oportunitats en salut al llarg de la vida i les palanques de canvi transversals
- b) La igualtat d'oportunitats en salut al llarg de la vida, les palanques de canvi transversals i la integració de l'atenció al llarg de la vida
- c) Les palanques de canvi individuals, els entorns saludables i la igualtat d'oportunitats en salut al llarg de la vida
- d) La integració de l'atenció a la salut, els entorns saludables, la igualtat d'oportunitats en salut al llarg de la vida i les palanques de canvi transversals**

S'ACCEPTA LA RECLAMACIÓ I S'ANUL·LA LA PREGUNTA

25. En quin moment de la RCP s'hauria de desfibril·lar un pacient en fibril·lació ventricular?

- a) Abans de començar la RCP
- b) Després de realitzar 5 cicles de RCP
- c) Després de realitzar 2 cicles de RCP
- d) Després de realitzar 1 cicle de RCP**

S'ACCEPTA LA RECLAMACIÓ I S'ANUL·LA LA PREGUNTA

26. Quina és la seqüència recomanada d'actuació en un pacient que ha patit una parada cardiorespiratòria?

- a) Comprovar la resposta, trucar a l'ambulància, iniciar la RCP, aplicar el desfibril·lador
- b) Trucar a l'ambulància, comprovar la resposta, iniciar la RCP, aplicar el desfibril·lador**
- c) Iniciar la RCP, comprovar la resposta, trucar a l'ambulància, aplicar el desfibril·lador
- d) Iniciar la RCP, trucar a l'ambulància, comprovar la resposta, aplicar el desfibril·lador

S'ACCEPTA LA RECLAMACIÓ I S'ANUL·LA LA PREGUNTA

31. Quin és el propòsit principal de la valoració dels signes vitals?

- a) **Monitoritzar la resposta del pacient als tractaments**
- b) Identificar les causes subjacents de la malaltia
- c) Establir un diagnòstic definitiu de la malaltia
- d) Preveure les complicacions futures de la malaltia

S'ACCEPTA LA RECLAMACIÓ I S'ANUL·LA LA PREGUNTA

32. Quina és la millor manera d'avaluar la funció respiratòria d'un pacient?

- a) **Comptar les respiracions per minut**
- b) Realitzar una radiografia del tòrax
- c) Mesurar la saturació d'oxigen en sang
- d) Demanar al pacient que parli durant uns minuts

S'ACCEPTA LA RECLAMACIÓ I S'ANUL·LA LA PREGUNTA

35. Quan hauria de ser preocupant una freqüència cardíaca elevada en un pacient?

- a) Quan la freqüència cardíaca és superior a 80 bpm
- b) Quan la freqüència cardíaca és superior a 100 bpm
- c) **Quan la freqüència cardíaca és superior a 120 bpm**
- d) Quan la freqüència cardíaca és superior a 140 bpm

S'ACCEPTA LA RECLAMACIÓ I S'ANUL·LA LA PREGUNTA

69. Quina de les següents tècniques d'exploració pot ajudar al diagnòstic de l'hemorràgia digestiva. Marqui la resposta certa:

- a) El tacte rectal
- b) Ènema rectal
- c) Sondatge nasogàstric
- d) **Totes són certes**

S'ACCEPTA LA RECLAMACIÓ I S'ANUL·LA LA PREGUNTA

89. Referent a l'alimentació i nutrició en cures pal·liatives. Assenyala la resposta CORRECTA:

- a) **L'adequació a les preferències individuals prèvies del malalt i els seus familiars són fonamentals**
- b) Les dietes toves o semitoves no es recomanen en persones amb malaltia terminal
- c) En una persona amb malaltia terminal avançada en situació d'estrenyiment associat a debilitat recomanarem una dieta rica en fibra
- d) Totes les respostes són correctes

NO S'ACCEPTA LA RECLAMACIÓ I NO S'ANUL·LA LA PREGUNTA

PROVA DE FISIOTERÀPIA D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA

1. Quina tipus d'articulació permet un major nombre de moviments:

- a) Diartrosis.
- b) Enartrosis.**
- c) Amfiartrosis.
- d) Sinartrosis.

S'ACCEPTA LA RECLAMACIÓ I S'ANUL·LA LA PREGUNTA

60. Respecte a la magnetoteràpia, és CERT que el pol:

- a) NORT atreu càrregues positives.
- b) SUR atreu càrregues negatives.
- c) NORT provoca recalcificació òssia.**
- d) Els dos pols tenen els mateixos efectes.

S'ACCEPTA LA RECLAMACIÓ I S'ANUL·LA LA PREGUNTA

91. Quin dels següents tipus d'investigació és qualitatiu:

- a) Metanàlisis.
- b) Fenomenologia.**
- c) Estudi de casos.
- d) Cap dels anteriors.

S'ACCEPTA LA RECLAMACIÓ I S'ANUL·LA LA PREGUNTA

99. La localització més freqüent d'un mielomeningocele és:

- a) Zona cervical
- b) Zona lumbosacra**
- c) Zona dorsolumbar
- d) L3

NO S'ACCEPTA LA RECLAMACIÓ I NO S'ANUL·LA LA PREGUNTA

PROVA D'INFERMERIA SOCIO SANITARI

30. Quina és la seqüència recomanada d'actuació en un pacient que ha patit una parada cardiorespiratòria?

- a) Comprovar la resposta, trucar a l'ambulància, iniciar la RCP, aplicar el desfibril·lador
- b) Trucar a l'ambulància, comprovar la resposta, iniciar la RCP, aplicar el desfibril·lador**
- c) Iniciar la RCP, comprovar la resposta, trucar a l'ambulància, aplicar el desfibril·lador
- d) Iniciar la RCP, trucar a l'ambulància, comprovar la resposta, aplicar el desfibril·lador

S'ACCEPTA LA RECLAMACIÓ I S'ANUL·LA LA PREGUNTA

68. L'establiment de les miccions programades, és un tractament eficaç per:

- a) Incontinència d'esforç
- b) Incontinència d'urgència
- c) Incontinència reflexa
- d) **Incontinència funcional**

S'ACCEPTA LA RECLAMACIÓ I S'ANUL·LA LA PREGUNTA

PROVA D'INFERMERIA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

30. En quin moment de la RCP s'hauria de desfibril·lar un/a pacient en fibril·lació ventricular?

- a) Abans de començar la RCP
- b) Després de realitzar 5 cicles de RCP
- c) Després de realitzar 2 cicles de RCP
- d) **Després de realitzar 1 cicle de RCP**

S'ACCEPTA LA RECLAMACIÓ I S'ANUL·LA LA PREGUNTA

32. Quina és la seqüència recomanada d'actuació en un/a pacient que ha patit una parada cardiorespiratòria?

- a) Comprovar la resposta, trucar a l'ambulància, iniciar la RCP, aplicar el desfibril·lador
- b) **Trucar a l'ambulància, comprovar la resposta, iniciar la RCP, aplicar el desfibril·lador**
- c) Iniciar la RCP, comprovar la resposta, trucar a l'ambulància, aplicar el desfibril·lador
- d) Iniciar la RCP, trucar a l'ambulància, comprovar la resposta, aplicar el desfibril·lador

S'ACCEPTA LA RECLAMACIÓ I S'ANUL·LA LA PREGUNTA

34. Quin és el ritme recomanat per a les ventilacions en la RCP segons les guies ERC en un adult?

- a) Una ventilació cada 2 segons
- b) **Una ventilació cada 4 segons**
- c) Una ventilació cada 6 segons
- d) Una ventilació cada 8 segons

S'ACCEPTA LA RECLAMACIÓ I S'ANUL·LA LA PREGUNTA

71. A partir de quina quantitat d'alcohol es considera que una dona té un consum de risc?

- a) Consum igual o superior a 20 grams (14 UBA)
- b) **Consum igual o superior a 24 grams (>17 UBA).**
- c) Consum igual o superior a 28 grams (>19 UBA)
- d) Consum igual o superior a 32 grams (>21 UBA)

S'ACCEPTA LA RECLAMACIÓ I S'ANUL·LA LA PREGUNTA

82. En relació al dolor crònic. Marca la resposta INCORRECTA:

- a) **És aquell dolor que dura més de 12 mesos**
- b) És aquell dolor que dura més de 3 mesos
- c) La principal causa és osteomuscular
- d) Tot i que el dolor no és una malaltia, aquest afecta a la qualitat de vida de les persones que el pateixen

NO S'ACCEPTA LA RECLAMACIÓ I NO S'ANUL·LA LA PREGUNTA

86. La vacunació antigripal està indicada en:

- a) Grups de persones de risc: malaltia cardiovascular, insuficiència renal
- b) Persones majors de 65 anys
- c) Persones que treballen al sector públic (polícies, professors/es, bombers/es..)
- d) **Totes les respostes són correctes**

S'ACCEPTA LA RECLAMACIÓ I S'ANUL·LA LA PREGUNTA

104. En relació a la comunicació no verbal. Marca la resposta correcta:

- a) **L'aparença física té una influència clara durant els primers minuts de la trobada**
- b) La proxèmica té a veure amb la comunicació no verbal
- c) El to de la veu i el ritme són aspectes de la quinèsica
- d) Totes les respostes són correctes

S'ACCEPTA LA RECLAMACIÓ I S'ANUL·LA LA PREGUNTA